

## Seznam č. 8 vybraných přípravků

| Přípravky obsahující:  | Podmínky:  |
|--|--|
| 1) jednu z omamných látek:<br>acetyldihydrokodein<br>dihydrokodein<br>ethylmorfin<br>folkodin<br>kodein<br>nikodikodin<br>nikokodin<br>norkodein | Mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky<br>a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmí přesáhnout 100 mg,<br>b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.               |
| 2) difenoxin   | a) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg.<br>b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě.        |
| 3) difenoxylát   | a) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg.<br>b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové formě. |
| 4) dextropropoxyfen  | Množství dextropropoxyfenu<br>a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě,<br>b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.<br>Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku.                          |
| 5) kokain  | Množství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu.   |
| 6) opium nebo morfin   | a) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %.<br>b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných).<br>Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví.                    |
| 7) ipekakuanhový prášek s opiem  | a) Množství opia v prášku nesmí být vyšší než 10 %.<br>b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %.<br>c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %.   |
| 8) propiram  | a) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě.<br>b) Množství methylcelulosity v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu.  |

Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.